

10. *C. Chevalieri*, sp. n.

*Tronc* inconnu. *Feuilles* dépassant 0.50 m. ; rachis peu caréné ; pinules étranglées juste au-dessus de l'insertion, longues de 17-27 cm. larges de 18 mm. environ, linéaires-lancéolées, terminées en pointe aiguë, parfois un peu falciformes, glabres, en nombre inconnu, supérieur à 24 de chaque côté ; nervure large de 1 mm., proéminente par-dessus, parfois creusée en gouttière par-dessous. *Fleurs* ♂ inconnues. ♀ *Carpophyllé* à partie terminale stérile, très profondément divisée dès au-dessus des ovules ; divisions longues de 3 cm., larges de 2.5-3 mm., parfois divisées en 2, au nombre d'une dizaine de chaque côté, glabres ; partie centrale indivise, longue de 4 cm., large de 2 cm., de forme ovale, couverte sur une seule face d'une épaisse pubescence brune, ainsi que la partie du pédicelle portant les ovules ; pédicelle strié, long de 3-5 cm., large de 3-5 mm. ; ovules 2 à 4. *Fruit* paraissant incomplètement mûr, de 2 cm. de diam., arrondi.

TONKIN occidental : (*Chevalier*). — Nord-ANNAM : prov. de Nghé-an (Vinh), délégation de Nghia-húng, à Tram-lui (*Chevalier*). —

NOM annam. : *Cây ngen*.

---