

CYCAS GLAUCA HORTER.

Ob difficultatem et incertam specularem *Cycas viviparæ* cum antiquiorum Romanorum iconibus comparationem, plantas quas hoc nomen in pluribus hortis cultas vidimus, ad perniciosius referre non potuimus. Antea *Cycas circinalis* vocæ synonymam habebamus, sed perperam. Difert enim foliis plurimisque pinnatibus, multo latioribus, v. c. 2 costis. Iam, multo magis latioribus, versus basin null. et apicem multum angustatis cost. Multo magis ad *Cycas Bampfii* accedit, imprimis ad varietatem hujus thacronem occupans. Cum autem *Cycas Bampfii* foliis a Cl. invento. . . non nisi breviter descripta sint, res ab omni dubio liberari soquit. Quod autem ut aliquando contingat sporam, *Cycas glauca* descriptioem addas, tam secundum speciem in fovea Parvati Rocii Bassanensi cultam ex Horto Pannorum Angliensium adjectam quam juxta exemplar Horti Boterobanensis conscriptam.

Caulex glaber (1—1½ pedum alt.) cylindricus. Frons e gemma squamis fuscis tomentosis tota erumpens, nascentes brevibus pili deciduis circumo, adules glaberrimas, rectos, 2—2½ metra longos. Stipes sub-trigonus, caries plana-convexus, pectus cordatis, spinulis utriusque 30—40 compressis. Rhachis tetragona: parte postica obtusa fere semiterete, planis duabus caricis sub angulo acuto valde profundante conjunctis, et aliquid a postica facie canali impresso directis, ubi foliis obliquiter utriusque 50—60, quarum inferiora 13 costis. longa, 1½ lata; mediae super magis approximate multo longiora 27—28 costis. longa, 1½ lata; superiora his non multum breviora; omnia linear-lanceolata, falcata, inferiora magis recta, imprimis junctura marginibus aliquando undulata. Nervus medius fortis, imprimis in pagina inferiore latetens. Color hinc viridis, in universum glaucosus, sed dorsum multo pallidior quam in pagina superiori. Marges subrevolutas.