

DE CANDOLLE

PRODROMUS

SYSTEMATIS UNIVERSALIS

REGNI VEGETABILIS

PARS XVI

SECTIO POSTERIOR

23. *Z. YATESII* (Miq. Cycad. quæd. americ. p. 2. t. 1 f. C.), trunco humili demum lævi, petiolo subtus tereti juniore basi subpiloso, foliolis alternis vel suboppositis utrinque 5-6 anguste linearibus glabris acutis prope apicem dentibus manifestis 1-3 serratis 5-7-nerviis, strobilo masc. stipite suo longiore conico-cylindrico, peltis convexis angulosis rubiginoso-hirtellis, fem. . . . 5 ex America calidiore in hortis Belg. et Amstelod. introd. — Miq. prodr. Cycad. p. 15, 27. Truncus 2½ poll. longus, inferne cylindricus, radicem fusiformem superans, superne incrassatus. Perulæ ovato-acuminatæ, pilosulæ, apice dense fusco-hirtellæ. Petiolus 4-10 cent. longus. Foliola remota, 10-18 cent. longa, 3-6 mill. lata, basi angustiora albida. Strobilus masc. 2 cent. longus. Peltæ squamarum subtus in duabus areis antheriferæ, breviter stipitatae.
24. *Z. STRICTA* (Miq. Cycad. quæd. amer. p. 3), petiolo teretiusculo, foliolis plerisque suboppositis utrinque 14-24 anguste linearibus subæquilongis utrinque præsertim apice angustatis integerrimis vel sub apice acuto vel obtusiore 1-2-denticulatis tenuiter 5-3-nerviis, strobilis. . . . Ex America calidiore Amstelodami introd. — Miq. prodr. Cycad. p. 15, 27. *Z. angustifolia* Miq. olim in Wiss. en Nat. Tijdschr. 1. p. 204 (non Jacq.). *Z. debilis* Lodd. Bot. cab. t. 155? (non Ait.). Truncus, parvus ellipsoideo-globosus, 2 poll. altus. Perulæ ut in *Z. angustifolia* et *Z. Yatesii*, sed paulo glabriores. Petiolus 2-5 lin. longus, nunc leviter compressus. Foliola inferiora subopposita, superiora fere opposita et confertiora, omnia plerumque antrorsum vergentia, media paulo majora, 4-12 cent. longa, 2 mill. lata, adpectu 3-nervia, ad lentem in medio 5-nervia.
25. *Z. MULTIFOLIOLATA*, foliis in petiolo et rhachi pilis demum evanescentibus pubescentibus, petiolo subtus tereti, foliolis alternis vel oppositis utrinque 40-60 anguste linearibus subæquilongis acuminatis integerrimis 3-nerviis, pedunculis pube erecta sericeis strobilo brevioribus, masculo cylindrico peltis contundatis subrotundis fusco-tomentosis, femineo duplo crassiore breviter obtuse acuminato peltis transverse hexagonis fusco-tomentosis. 4-5 in Cuba orientali (Wright! 597 in h. meo et Boiss.) *Z. stricta* Griseb. cat. pl. Wright. p. 217, sine descr. (sed partem alt. specimenum ad *Z. angustifolium* Jacq. refert). Cum nulla specie Miquelii quadrant nostra specimina. Ab omnibus differunt numero foliolorum, 43 in specimine meo, 61 in spec. h. Boiss., utroque latere folii. Forma et nervis foliolorum magis *Z. angustissimæ* Miq. quam aliis similis, sed in illa flores ignoti. Perulæ basi 2-3 cent. longæ, sericeæ, acuminatæ. Petiolus 25-30 cent. longus, supra canaliculatus. Rhachis petiolo longior. Foliola media paulo majora, 11-12 cent. longa, 1½-2 mill. lata, rigida, patentia, basi vix angustiora, margine ut vulgo revoluta, ibi et apice callosa, nervis bene utrinque distinctis. Pedunculi 4-6 cent. longi, pube cinerea, masculi graciliores, flexuosi. Strobilus mas 6 cent. longus, 1½ cent. latus, acutiusculus; fem. non longior duplo crassior, peltis centim. transverse longis, planis vel exsic. in medio depressis. (v. s.)
26. *Z. ANGUSTISSIMA* (Miq. Cycad. quæd. amer. p. 4. t. 1 f. B, folii), petiolo basi pilosulo cæterum glabro subtus tereti, foliolis oppositis vel alternis utrinque circiter 12 angustissime linearibus acutiusculis integerrimis supra trinerviis, strobilis. . . . 5 Ex America calidiore in hort. Belg. et Amstelod. introd. — Miq. prodr. Cycad. p. 15, 27. Truncus 5 cent. longus, inferne cylindricus, superne incrassatus. Perulæ lanceolatæ, carnosæ, pilosulæ. Folium glabrescens. Foliola gramineo-viridia, media majora 12-15 cent. longa, 1½ mill. lata, nervis supra solum perspicuis.

Species dubia.

27. *Z. GALEOTTI* (Vriese in Tijdschr. nat. Gesch. 1845. p. 23, ex Duch. rev. bot. 1845 p. 211), rachi subtereti glabra elongata, foliolis oppositis e basi angustiore oblongis integerrimis longe acuminatis fere dimidiatis uno latere convexo altero recto apicem versus utrinque attenuatis. — E Mexico in hort. Amstel. introducta.

Species exclusæ.

- Z. CALOCOMA* Miq. = *Microcycas calocoma*.
Z. CORSONIANA G. Don. = *Cycas Rumphii*?