

Differt a specie: foliolis minoribus, magis coriaceis, obtusis, nec acuminatis.

16. *ZAMIA INTEGRIFOLIA* AIT. — MIQ. *l. c.* p. 67. *Cat. Loddig.* 183!

17. *ZAMIA MEDIA* WILLD. — MIQ. *l. c.* p. 68. — *Cat. Loddig.* N^o. 182! Foliola speciminis Loddigesiani paullo latiora ac in specimine Herbarii Willdenoviani, et ad marginem superiorem magis serrulata, 11—14 cent. longa, $1\frac{1}{2}$ —1 cent. 8mm. lata.

18. *ZAMIA LODDIGESII* MIQ. — Caudice..... rhachi subspinulosa, foliolis erecto-accumbentibus, lanceolatis, versus apicem attenuato-acuminatis, basi contractis (fere duodecies longioribus quam latis) coriaceis, utroque margine, inde ab $\frac{1}{4}$ alt. a basi, remotius, versus apicem confertius spinuloso-serrulatis, marginibus subrevolutis.

Syn. Zamia serrulata Catal. Loddig. N^o. 184!

————— *Caracasana ejusdem.* N^o. 185!

Habitat in America, an in Caracasana?

Ab omnibus, quas novi speciebus, evidentissime differt; quoad foliolorum formam ad *Z. mediam* et *Z. debilem* e longinquo accedit, sed compage et serraturis *Z. muricatae* similior. Foliolis in hoc genere longissimis, rigidis, acute serrulatis, versus apicem valde attenuatis, ad rha-

chin accumbentibus, inter congeneres valde insignis.

Rhachis subspinulosa. *Foliola* ad rhachin erecto-accumbentia, 19 cent. circiter longa, $1\frac{1}{2}$ —1 cent. 8 mm. lata, elongato-lanceolata, subinaequilateralia, basi angustata, inde a medio vel $\frac{1}{4}$ jam alt. sensim attenuata acuminata, coriacea, nitidula, nervosa, nervis in pagina inferiore pallidiores magis prominentibus, 22—27 circiter, hic illic bifurcatis; marginibus parumper incrassatis subrevolutis; serraturae inde ab $\frac{1}{4}$ alt. a basi, (subinde in uno margine altius ac in altero, aliquando ad eandem altitudinem) incipientes, spinulosae, corneae, durae, pungentes, sub lente obtusiusculae, 1 mm. circiter longae, primum remotae, $2\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ cent. distantes, versus apicem confertiores demumque confertae, 1— $1\frac{1}{2}$ cent. distantes et paullo longiores.

19. ZAMIA PUMILA LINN. — MIQ. *l. c.* p. 69. *Zamia debilis* Catal. Loddig. N^o. 173! Ex unico foliolo non tuto extricanda, sed *Z. pumilae* proxime affinis et vix nisi foliis brevioribus diversa. Certissime pro *Z. debili* non habenda.

20. ZAMIA DEBILIS WILLD. MIQ. *l. c.* p. 71. Tab. VIII. fig. 13. *Zamia prunifera*, foliis elongatis petiolis non spinosis Catal. Loddig. N^o. 181!

Specimen Loddigesianum optime quadrat cum eo quod *l. c.* descripsi, in insula Pavonum culto;