

*lanceolatis mucronatis binis terminalibus, uno parum infra apicem ad latus exterius posito. Stipes semiteres canaliculatus glaber. W.*

\*4. *ZAMIA angustifolia. Jacq.*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis linearibus integerrimis apice calloso biemarginatis obtusis, stipite semitere- reti. W.*

*Z. foliolis linearibus muticis apice calloso-biemarginatis, stipite tereti inermi. Jacq. ic. rar. 3. t. 636. Collect. 3. p. 263.*

Schmalblättrige Keulpalme. W.

*Habitat in insulis Bahamensibus. Fr. (v. v. in horto Schoenbrunnensi.)*

\*5. *ZAMIA tenuis. Willd.*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis linearibus basi attenuatis obtusis sub apice obsolete uni- f. bidentatis margine subrevoluto, stipite triquetro glabro. W.*

Dünne Keulpalme. W.

*Habitat in insulis Bahamensibus. Fr. (v. v.)*

*Frons pinnata. Foliola sub 14-juga linearia basi attenuata apice obtusa, in superioribus sub apice dente uno binisve valde obsolete instructa, margine subrevoluta. Stipes triquetrus canaliculatus glaber. Medium tenet inter praecedentem et sequentem. Forma foliorum fere praecedentis sed stipes triquetrus et foliola latidra. Foliola angustiora quam in sequente, nec sub apice obsolete serrulata stipes vero idem. W.*

\*6. *ZAMIA media. Jacq.*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis obtusis sub apice obsolete serrulatis planis, stipite triquetro glabro. W.*

*Z. foliolis oblongo-linearibus subintegerrimis muticis rectis, stipite tereti inermi. Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 77. t. 397. 398.*

Mittlere Keulpalme. W.

*Habitat in India occidentali. Fr. (v. v. f. fl. in horto Schoenb.)*

*Frons pinnata. Foliola 7-15-juga lanceolato-linearia plana obtusa sub apice obsolete serrulata, inferio-*

*ra etiam apice integerrimis. Stipes glaber superne triquetrus. W.*

\*7. *ZAMIA debilis. Jacq. ex Aiton*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis lanceolatis acutis muticis, apice serratis, stipite triquetro glabro. W.*

*Z. foliolis linearibus muticis apice serrulatis patenti-recursis rachi canaliculata longioribus, stipite triquetro compresso inermi. Ait. Kew. 3. p. 478.*

*Palma prunifera humilis non spinosa insulae Hispaniolae, fructui jujubino similis, officulo triangulo. Commel. hort. 1. p. 111. t. 58.*

Schwache Keulpalme. W.

*Habitat in India occidentali. Fr.*

*Frons pinnata. Foliola lanceolata acuta mutica apice serrata 5-7 juga. W.*

\*8. *ZAMIA integrifolia. Jacq. ex Aiton*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis lanceolatis rotundato obtusis basi attenuatis latere exteriori ad apicem serrulatis, stipite glabro subtetragono. W.*

*Z. foliolis subintegerrimis obtusiusculis muticis rectis nitidis, stipite inermi. Ait. Kew. 3. p. 478. Jacq. ic. 3. t. 635. Collect. 3. p. 261.*

*Z. (pumila) frondibus pinnatis, foliolis suboppositis lanceolatis. Sp. pl. 1659 nec synonyma.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 1. p. 471.*

Ganzblättrige Keulpalme. W.

*Habitat in Domingo et Florida orientali. Fr. (v. v. in horto Schoenb.)*

*Frons pinnata. Foliola sub novemjuga lanceolata basi attenuata apice rotundato-obtusa integerrima vel in superioribus foliolis sub apice in latere exteriori, quandoque in utroque, serrulata. Stipes glaber tetragonus praecipue superne. W.*

\*9. *ZAMIA muricata. Willd.*

*Z. frondibus pinnatis, foliolis oblongis acuminatis a medio ad apicem serratis laevibus, stipite muricato. W.*

*Zamia muricata. Humboldt et Bonpland.*

Stumpfdornige Keulpalme. W.